

M004

### **ICSI CON ESPERMATOZOIDES TESTICULARES**

*Ochoa Marieta, C.; Lertxundi Barañano, R.; López Arregui, E.  
Clínica Euskalduna. Bilbao.*

La extracción testicular de espermatozoides (TESA), combinada con la inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) se ha convertido en un tratamiento generalizado para los varones azoospermicos.

El propósito de esta comunicación es relacionar el diagnóstico anatómo-patológico, la edad y el éxito del (TESA).

#### **Material y método**

Se analizan los casos de 17 varones azoospermicos que se someten a biopsia múltiple testicular. Y se analizan los resultados de los 8 (47%) en lo que habiéndose obtenido espermios testiculares, se realiza la técnica de ICSI a sus parejas.

Se exponen los resultados (fecundación y transferencia embrionaria en todos los casos; embarazos y nacimientos en tres de los casos (42%).

#### **Conclusiones**

Dado los buenos resultados, debe de realizarse una biopsia de testículo a todos los varones azoospermicos, para orientarse sobre la realización de ICSI.

M005

### **RELACION PESO-ACO**

*Ramirez Polo, I.; Chover González, A.; Coco Alonso, M. J.; Mainé Martínez, A.  
Amb. Hnos. Laulhe. Planif. Familiar y Facultad Medicina Cádiz. Farmacología.*

Estudio prospectivo de 139 mujeres y un grupo control, de dos años de duración. Todas debían cumplir unos criterios de inclusión. Se calculó el IMC para todas ellas al inicio del estudio, a los 6 meses, al año y a los dos años (al inicio y dos años para el grupo control). El grupo en estudio se dividió en 5 subgrupos según el contenido hormonal del anticonceptivo que tomaron.

#### **Análisis Estadísticos**

La comparación entre grupos se realizó utilizando un anova a 2 factores (tratamiento y tiempo) para medidas repetidas, seguido de anova factorial para cada grupo y tiempo. La T de Studens para datos apareados, para comprobar el efecto global de los ttos. (valores antes vs después del tto).